

Protocole pour Projet d'Accueil Individualisé (Enfant qui a déjà fait une réaction allergique)

Date de réalisation :

Année scolaire 201.....-201.....

Etablissement :

Classe :

Coordonnées de l'enfant			
Nom et prénom :			
Date Naissance :	Âge :	Poids en kg, valable pour l'année scolaire :	
Personnes à contacter en cas de besoin :	en 1er :		
	en 2nd :		
	autres :		

Aliments concernés par le PAI

Aliment 1 à éviter	
Description du régime	
Éviter même sous formes de traces : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> No Contact autorisé (cours de cuisine) : <input type="checkbox"/> Ou <input type="checkbox"/> No	
Précisions sur le régime d'éviction	
Aliment 2 à éviter	
Description du régime	
Éviter même sous formes de traces : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> No Contact autorisé (cours de cuisine) : <input type="checkbox"/> Ou <input type="checkbox"/> No	
Précisions sur le régime d'éviction	
Aliment 3 à éviter	
Description du régime	
Éviter même sous formes de traces : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> No Contact autorisé (cours de cuisine) : <input type="checkbox"/> Ou <input type="checkbox"/> No	
Précisions sur le régime d'éviction	

En cas de consommation accidentelle

Ne pas laisser l'enfant seul. Le calmer. Le rassurer

Appeler ou faire appeler le 15 (composer le 15 depuis un poste fixe ou le 112 depuis un portable)

ET DIRE : "Enfant qui a déjà fait une réaction allergique sérieuse à

.....

J'observe une réaction anormale. Que dois-je faire ? "

J'observe une réaction anormale :	JE FAIS :
Des boutons rouges qui démangent comme des piqûres d'ortie - ou un gonflement des lèvres sans gêne pour parler ou respirer ou le nez qui coule ou éternuements - ou une rougeur, un gonflement ou des démangeaisons des yeux - ou un mal de ventre inhabituel	Aerius ou Desloratadine ml en 1 prise buvable ET Solupred ou comprimé(s) en 1 prise, à Prednisolone, comprimés faire fondre dans un peu orodispersibles 20mg d'eau
En cas gêne pour respirer, de forte toux, de sifflements	Même si vous n'avez pas réussi à joindre le 15, donner : 2 bouffées de VENTOLINE dans la chambre d'inhalation puis faire respirer 10 fois ET Solupred ou comprimé(s) en 1 prise, à Prednisolone, comprimés faire fondre dans un peu orodispersibles 20mg d'eau ORO 20 mg : ET Si pas d'amélioration au bout de 5 minutes, redonner 2 bouffées de Ventoline. ET Si pas d'amélioration au bout de 5 minutes, redonner 10 bouffées de Ventoline.
Si perte de connaissance:	Allonger l'enfant sur le dos, jambes en l'air, tête basse
En cas de difficultés importantes à respirer, à avaler ou à parler, de fortes douleurs de ventre, de vomissements ou de diarrhées, de perte de connaissance, de malaise en dehors d'un traumatisme	Même si vous n'avez pas réussi à joindre le 15 INJECTER dans le muscle du devant de la cuisse une dose avec le stylo injecteur d'adrénaline (JEXT ou ANAPEN OU EPIPEN).

EN CAS DE SORTIE :

connaître les numéros d'urgence du lieu de visite et faire suivre la trousse d'urgence et les consignes

Cachet et coordonnées du médecin