

Protocole d'urgence : Crise convulsive

En cas de crise convulsive généralisée :

Enfant perdant conscience, devenant tout mou, présentant une révulsion oculaire, des mouvements saccadés, une raideur généralisée...

➤ Il faut :

- Vérifier la respiration de l'enfant : thorax se soulevant, respiration entendue si on rapproche l'oreille, noter coloration des lèvres (bleues ?).
- Noter l'heure de début et de fin de la crise.
- **APPELER LE 15** et dire : **Enfant INCONSCIENT - CONVULSION - VALIUM ou BUCCOLAM à l'école.**

Simultanément :

- Ne pas déplacer l'enfant pendant la crise, le coucher sur le côté, mettre une protection sous sa tête
- Ecarter tous les objets autour de lui afin qu'il ne se blesse pas
- Eloigner les autres enfants
- Ne rien mettre dans sa bouche, desserrer les vêtements au niveau de la ceinture et du col

Si :

<p><u>VALIUM prescrit</u></p> <p>Administration sur demande du médecin régulateur du centre 15</p>	<p><u>BUCCOLAM prescrit</u></p> <p>Si la crise dure plus de 5 minutes, même si réponse non immédiate du 15</p> <ul style="list-style-type: none"> - administrer le Buccolam par voie orale - mettre l'enfant sur le coté dès que possible et basculer doucement la tête en arrière
--	--

- Prévenir la famille
- **Ne pas quitter l'enfant**

Date.....

Signature et cachet du médecin de l'enfant